L'OISEAU LA VIERGE

Terpsiphone bourbonnensis

Terpsiphone de Bourbon
Mascarene Paradise Flycatcher

DESCRIPTION

L'Oiseau la vierge est un passereau forestier de taille moyenne (15 cm). Les adultes sont parés d'un plumage gris bleu sur le dessus de la tête (plus foncé et brillant chez le mâle) ainsi que d'une crête érectile. Le bec et un fin liseré sur le pourtour de l'oeil sont d'un bleu turquoise profond. Le reste des parties supérieures est roux tandis que les parties ventrales sont grises teintées de bleu ardoisé.
L'immature a la tête brune, plus ronde, l'iris noir et le plumage de l'ensemble du corps uniformément brun roux. Il diffère également de l'adulte par le bec gris rosé, les tarses et les doigts rose pâle.
Le chant est surtout entendu pendant la période de nidification. Il est flûté, mélodieux et composé d'une cascade de notes répétitives de plus en plus hautes souvent reprises plusieurs fois de suite. Un autre cri est à l'origine de son nom créole «Chakouat». Le cri d'alarme est un grincement plus ou moins accentué et long suivant l'inquiétude de l'oiseau.

LOCALISATION



L'Oiseau la vierge est exclusivement forestier et se rencontre généralement dans les forêts primaires. Plus bas, il est parfois cantonné dans des ravines contenant encore quelques pieds d'espèces végétales indigènes. Comme la plupart des oiseaux forestiers, et après chaque saison de nidification, il redescend les ravines arborées vers des sources de nourritures plus variées et plus abondantes.

1 - Oiseau la vierge dans son milieu
2 - Gros plan de la tête du mâle
3 - Oiseau la vierge femelle
4 - Carte de répartition (orange)

Conception : Bureau d'Etudes Régional ONF d'après des documents de J.M. PROBST

NOURRITURE

Le régime alimentaire de l'Oiseau la vierge est surtout composé de petits insectes.
Il les capture généralement en vol dans la frondaison des arbres ou les poursuit en l'air (coléoptères, mouches, papillons). Plus rarement, au ras de l'eau, il a parfois été observé en train de se nourrir d'araignées.
Hors de la période de reproduction, il s'associe souvent aux rondes d'Oiseaux blancs et prospecte méticuleusement les feuillages à travers la forêt.

6

5

REPRODUCTION

La période de nidification s'étend de septembre à décembre. Le nid en forme de coupe grossière est installé à la fourche d'un arbre (Bois maigre, Change écorce, Mahot, Mapou). Il est constitué de brindilles, de mousses, de racines, de fibres végétales, parfois garni de feuilles. La ponte annuelle est de deux à trois oeufs blanc rosé mouchetés de gris et de brun rouge. Une ponte de remplacement est possible en cas d'échec de la première. Les poussins restent au nid un peu plus de deux semaines puis suivent leurs parents pendant plusieurs mois jusqu'à leur autonomie complète.

7

STATUT / HISTOIRE

De la famille des Monarchidae, le genre Terpsiphone contient 14 espèces tropicales dont 5 dans les îles de l'Océan Indien. L'Oiseau la vierge est séparé en deux sous-espèces chacune endémique d'une île : *T.b. bourbonnensis* à La Réunion et *T.b. desolata* à Maurice.
La forme réunionnaise est relativement commune dans les forêts indigènes (entre 48 000 et 50 000 individus). En revanche, la sous-espèce mauricienne est rare (moins de 250 couples) et ne se rencontre plus que dans la forêt du Sud Ouest de l'île.
Autrefois distribué dans toute l'île, du littoral jusqu'à 1 800 mètres d'altitude, l'Oiseau la vierge a fortement reculé avec la déforestation de la végétation indigène. Il est aujourd'hui cantonné dans la plupart des forêts des Hauts. Toutefois, lorsque la végétation indigène de basse altitude est préservée (forêts du Tremblet, Cratère), sa densité est nettement supérieure.
Il figure sur la liste des espèces protégées de l'arrêté ministériel du 17 février 1989. Il est donc strictement interdit de le chasser, de le maintenir en captivité et de le gêner de quelque façon que ce soit.

5 - Oiseau la vierge immature
6 - Nid d'Oiseau la vierge

7 - Distribution du genre Terpsiphone dans l'Océan Indien (en rouge. En rouge moucheté, présence aléatoire)