

# Travailleur à bec rouge

FAUNE

Nom scientifique *Quelea quelea*

Synonymes

Famille Ploceidae



Photographies : © Wikimedia (B. Dupont) / © Wikimedia (C.J. Sharp) / © Wikipedia (P. Ryszawa)

## DESCRIPTION

**Allure générale** Le Travailleur à bec rouge est un oiseau de petite taille, mesurant environ 12 cm pour un poids de 15 à 26 grammes. En dehors de la période de reproduction, mâles et femelles arborent un plumage brun-beige et un bec de couleur rouge. En période de reproduction, le plumage des mâles et des femelles adultes diffèrent. Les colorations des mâles reproducteurs sont variables, ils peuvent présenter un masque facial noir et une poitrine roussâtre teintée de rose. La femelle présente un bec de couleur jaune.

**Signes caractéristiques** En dehors de la période de reproduction, le Travailleur à bec rouge peut être aisément confondu avec d'autres espèces d'oiseaux introduites à La Réunion : Veuve dominicaine (*Vidua macroura*), Moineau domestique (*Passer domesticus*), Foudi de Madagascar (*Foudia madagascariensis*).



## ÉCOLOGIE


**Alimentation** Le Travailleur à bec rouge est un granivore généraliste. Il peut également se nourrir d'insectes, d'araignées et d'escargots, en particulier à certaines périodes de son cycle de vie (reproduction, nourrissage des oisillons). Son régime alimentaire à La Réunion n'est pas documenté.

**Reproduction** Dans son aire de répartition d'origine, cet oiseau se reproduit au sein de colonies qui peuvent atteindre des millions d'individus. Comme le Tisserin gendarme (*Ploceus cucullatus*), il construit des nids de forme ovale tissés en fibres végétales. A La Réunion le pic de reproduction aurait lieu en février-mars.

**Habitat** Espèce affectionnant les habitats ouverts semi-arides (prairies arbustives, fourrés d'épineux...). A La Réunion, il est rencontré essentiellement sur le littoral de la côte ouest dans les prairies, les savanes arborées et les parcelles de filaos (*Casuarina equisetifolia*).

**Comportement général** Cette espèce grégaire et très sociable peut former des groupes de plusieurs millions d'individus. Elle dort, se nourrit et se déplace au sein d'immenses groupes d'individus.

## DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE



Données issues de Borbinita.re

## ÉTAT D'INVASION À LA RÉUNION

**La Réunion** Cet oiseau a été signalé pour la première fois à La Réunion au tout début des années 2000. La raison de son introduction n'est pas connue. La première colonie a été mentionnée en 2001 dans l'Ouest de l'île, à la Pointe-au-Sel. L'espèce a aujourd'hui colonisé le littoral de l'île, de Saint-Denis à Saint-Joseph.

**Et dans le Monde ?** Espèce originaire des zones sèches de l'Afrique subsaharienne. Le Travailleur à bec rouge est considéré comme l'un des oiseaux sauvages les plus abondants au monde. Depuis les années 1980 son aire de répartition est en expansion, en particulier en Afrique du Sud. A l'heure actuelle La Réunion est la seule île au monde où l'espèce aurait été introduite et se reproduirait. La présence d'individus, probablement échappés de captivité, a néanmoins déjà été signalée à Singapour et aux États-Unis

## IMPACTS

Le Travailleur à bec rouge est considéré comme un ravageur des cultures céréalières en Afrique.

Son impact écologique est peu documenté à La Réunion, en revanche il induit des nuisances sonores pour les riverains habitants à proximité des colonies d'oiseaux. En outre, comme le Tisserin gendarme, il est capable de dégarnir les arbres pour construire son nid.

Enfin il pourrait également avoir un impact non négligeable sur les insectes, si comme en Afrique près de la moitié du régime alimentaire des oisillons en est constitué.

## USAGES

Oiseau de cage et de volière



## RÉGLEMENTATION / PROGRAMME DE CONTRÔLE

L'introduction du Travailleur à bec rouge dans les milieux naturels de La Réunion est interdite, par l'arrêté ministériel du 9 février 2018.