



## Café-fleur

Tic-tic, vanille marron, acanthe mauve, gueule de loup

<b>Nom scientifique</b>	Phlogacanthus turgidus
<b>Synonymes</b>	Meninia turgida, Cystacanthus turgidus
<b>Famille</b>	Acanthaceae



## DESCRIPTION

Photos : buisson et inflorescence (CBNM, Christophe Lavergne et Marie Lacoste) - Rameau fleuri (© Véronique Lavergne)

**Allure générale** Arbrisseau dressé, très ramifié, buissonnant, haut de 1,5-3 m.

**Feuilles** Simples, opposées-décussées, à consistance de papier, elliptiques à oblongues, en pointe au sommet et atténuée en coin à la base, 10-20 x 3,5-8,5 cm, à nervures secondaires ± proéminentes face inférieure ; nervure médiane et pétiole portant de petites glandes.

**Fleurs** Racèmes terminaux souvent ramifiés, longs de 10-20 cm, poilus, à calice divisé en 5 parties, long de 7-10 mm, à corolle blanche, longue de 2,5-3,5 cm, tachée de rose, pourpre, violette ou mauve à gorge jaune.

**Fruits** Capsules subcylindriques, longues de 3,5-4,5 cm, marquées par des sillons. Le fruit éclate à maturité au niveau des sillons longitudinaux.

**Graines** Graines de contour ovale, aplaties, de 5-6 mm de long, noirâtres et légèrement pubérulentes.

**Caractéristiques** Arbrisseau dressé et buissonnant, de taille moyenne, à rameaux tétragones, à feuilles opposées décussées, à inflorescences terminales de fleurs à corolle blanche tachée de rose pourpre violette ou mauve à gorge jaune.



## ÉCOLOGIE

**Mode de reproduction**

Sexué et végétatif (bouturage de fragments de tiges).

**Mode de dissémination**

Graines sont projetées à quelques mètres à proximité du pied-mère par éclatement des capsules.

**Conditions de développement**

Se développe préférentiellement dans des stations humides de basse altitude. Tolère l'ombre d'un sous-bois.

## DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE



Source : Mascarine Catediana

**Aire d'origine** Indochine (Laos et Viêt-nam)

## ÉTAT D'INVASION À LA RÉUNION

- Réunion** D'introduction relativement récente, elle est localement naturalisée dans les forêts humides secondarisées de basse altitude où elle peut former des fourrés denses monospécifiques. On la trouve au nord dans la Ravine des Lataniers (La Possession), et au sud à St-Philippe, au bord de la route dans le Grand Brûlé, sur le littoral du Tremblet et à Bois Blanc.
- Monde** Introduite, cultivée et parfois naturalisée aux Seychelles et dans les Mascareignes (Réunion et Maurice). Son comportement envahissant n'a été signalé qu'à La Réunion.

## IMPACTS

Peut localement former des fourrés denses monospécifiques qui empêche la régénération et le développement des espèces indigènes.

## USAGES



Couramment cultivée comme plante ornementale, pour faire des haies principalement. Elle possède également une valeur médicinale.

## RÉGLEMENTATION / programme de lutte

Cet arbrisseau fait partie des espèces de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM. Elle ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier.