


Faux poivrier blanc

L'encens

Nom scientifique *Rhus longipes*

Synonymes

Famille Anacardiaceae



Photos: CBNM (Ch.Fontaine / M.Barbé / M/Barbé)

DESCRIPTION

- Allure générale** Arbuste ou petit arbre épineux atteignant 8 m de hauteur, avec des branches tombantes. Il est ramifié dès la base.
- Feuilles** Feuilles trifoliolées, à folioles obovales elliptiques avec des veines distinctes. Les feuilles jeunes sont pubescentes.
- Fleurs** Petites fleurs jaune verdâtre, en épis lâches à l'aisselle des feuilles et terminales. Calice persistant à 5 lobes imbriqués, fleurs mâles et femelles séparées.
- Fruits** Petits fruits charnus de couleur rouge pâle ou chair, au goût proche de celui du raisin.
- Graines** Noyau comprimé latéralement et coriace.
- Caractéristiques** Arbuste au feuillage vert clair et épineux, avec des grappes de petits fruits rosâtres.



ÉCOLOGIE

Mode de reproduction

Semis de graines.

Mode de dissémination

Dispersion des graines par gravité, puis par les eaux de ruissellement (ravines). Fruits disséminés par les oiseaux sur de longues distances.

Conditions de développement

Forêts naturelles ou plantées, zones rudérales et milieux perturbés, friches et le long des cours d'eau, en milieu plutôt sec. Pousse au Zimbabwe de 1000 à 1700 m d'altitude.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE



Source: Mascarine Catediana

Aire d'origine Afrique australe et de l'Est

ÉTAT D'INVASION À LA RÉUNION

Réunion Cette plante est présente à La Réunion notamment dans les régions sèches de basse altitude, notamment dans le zone de La Montagne et de la Grande Chaloupe.

Monde Cette plante n'a jusqu'à présent été introduite et ne s'est naturalisée qu'à La Réunion.

Sites à consulter:

<http://www.zimbabweflora.co.zw> <http://www.fao.org/forestry> <http://www.issg.org/>

IMPACTS

Espèce introduite qui peut être particulièrement envahissante. Elle peut devenir dominante ou co-dominante dans les milieux naturels ou peu perturbés. Elle concurrence alors la flore indigène empêchant le développement et la régénération des plantules. Forme des fourrés très denses.

USAGES



Aucun usage à La Réunion

RÉGLEMENTATION / programme de lutte

Elle fait partie des espèces de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM. Cette plante ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier mais d'actions ponctuelles et locales de contrôle ou d'éradication dans le cadre des travaux de restauration de la forêt semi sèche.