



Tangue

Tenrec acaude

Nom scientifique *Tenrec ecaudatus*

Famille Tenrecidae

Synonymes



Photos: Asconit - G.Gassiole / L.Le Gorrec

DESCRIPTION

Allure générale

Petit mammifère d'une taille de 26 à 39 cm environ (adulte). Les individus adultes peuvent peser jusqu'à 2 kg. Chez les individus adultes, le corps est recouvert de longs poils. Il porte une crête épineuse érectile sur la nuque. Le pelage des adultes est brun avec le ventre jaune clair à gris blanchâtre. Le museau est allongé et les oreilles sont petites et arrondies. Il n'a pas de queue.

Signes caractéristiques

Les jeunes sont sensiblement plus épineux que les adultes et ont une coloration caractéristique avec le ventre jaune et des bandes longitudinales noires et crèmes sur le dos, qui disparaissent avec la première mue. Les juvéniles peuvent produire des ultrasons en frottant les épines rigides de leur bande dorsale les unes contre les autres.

A ne pas confondre avec le hérisson dont les piquants sont rigides et plus nombreux et qui a la capacité de se rouler en boule pour se protéger.



ÉCOLOGIE

Alimentation : Animal omnivore, il se nourrit d'une grande variété d'invertébrés et de petits vertébrés qu'il cherche dans la litière du sol. Il consomme également des végétaux et des fruits.

Reproduction : Après une période de gestation de 2 mois environ, les femelles donnent naissance à des portées pouvant atteindre 32 individus. Cette stratégie de reproduction semble être une adaptation à la prédation très élevée dans son aire d'origine (Madagascar).

Habitat : Il occupe une large gamme de milieux (forêt, milieux dégradés, jardins,...) allant du littoral jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude.

Comportement général : Essentiellement nocturne. Le cycle annuel du tangue est composé de trois phases principales: activité, torpeur, reproduction. La phase de torpeur a lieu pendant la saison froide.

ÉTAT D'INVASION

Réunion : Le tangué est été introduit à partir de Madagascar en 1801 afin de nourrir les travailleurs des plantations de canne à sucre. Il est aujourd'hui largement répandu à travers l'île de la Réunion.

Monde : Animal originaire de Madagascar qui n'a été introduit que dans les îles de l'Océan Indien, à savoir Maurice, les Seychelles et les Comores.

Références: 12, 33, 38, 42

IMPACTS

L'impact des tangués à La Réunion sur l'environnement est encore mal connu mais est supposé négatif sur les invertébrés voire certains reptiles. En effet, aux Seychelles, son comportement de prédateur contribue de manière avérée à fragiliser les populations de plusieurs espèces endémiques de scinques (reptiles) et d'escargots (mollusques).

Les résultats d'une thèse récente ont montré une séroprévalence de 13,2% (Leptospirose) chez les tangués prélevés et l'auteur recommande de faire vacciner les chiens les plus exposés, tels que les ceux utilisés pour la chasse au tangué.

USAGES



Gibier de chasse



RÉGLEMENTATION / programme de contrôle

Le tangué est une espèce de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de La Réunion (arrêté ministériel du 25 août 2008). Il est chassé pendant environ deux mois chaque année et est très apprécié pour sa viande.