

VEPRIS LANCEOLATA

Patte poule

Description de l'espèce

Arbre monoïque à branches grêles. Famille des Rutacées.

Ecorce gris clair, lisse ou légèrement striée.

Feuilles longuement pétiolées, insérées en hélice et composées de 3 folioles sans pétiole. Les folioles sont de forme elliptique à obovale, avec de nombreuses nervures latérales ascendantes disposées parallèlement et se rejoignant près du bord qui peut être ondulé chez certains individus.

Petits fleurs unisexuées à 4 pétales jaunes ou blancs-verdâtres et groupées à l'extrémité des rameaux.

Les fruits sont des drupes à l'aspect carré de 7 à 8 mm de côté, avec 4 loges contenant chacune une graine jaunâtre, à l'aspect plissée et en forme de quart de sphère.



Espèce assez rare en milieu naturel.

Indigène ; classée vulnérable (VU).



Rameau adultes en fleurs et en fruits

Récolte

Sur pied ou au sol.

Signes de maturité du fruit : le fruit passe du vert au noir et grossit.


Protocole : aucun en particulier.

Période de récolte : avril - mai.

Récolte en milieu naturel : assez délicate en raison de la relative rareté de l'espèce et de leur situation qui ne permet pas toujours une récolte sereine (individus fréquemment en bordure de barre rocheuse). En revanche les semenciers fructifient généralement beaucoup. 12 pieds ont été récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.

Manipulation post-récolte : éviter de laisser sécher les fruits et les dépulper.

Nombre de graines par fruit : 4 le plus souvent.



Graines

3 mm

Mise en culture

Taux de germination : 9 % (taux compris entre 0 et 83 % selon les lots).

Durée avant 1^{ère} levée : 45 à 90 jours.

Age avant repiquage : 60 à 180 jours.

Problèmes / observations lors de la culture :

- germinations très étalées dans le temps ;
- carence en minéraux rapidement visible (le feuillage jaunit) ;
- être vigilant lors du sevrage car les plants se dessèchent facilement ;
- croissance rapide : 8 à 10 mois

Taux de mortalité après repiquage : 29 %.



Plantule

Plantation

Stade dynamique : non connu.

Nombre de plants réintroduits : 1 643.

Taux de mortalité après plantation : élevé la 1^{ère} saison (42 %) à faible la 2^{ème} saison, 10 %. La forte mortalité enregistrée sur la première saison est probablement due aux excès d'eau du fait de précipitations importantes, d'autant que l'espèce a été plantée sur des semaines très arrosées.

Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé, 57 à 69 % selon la saison.

Croissance moyenne 1 an après plantation : 22 cm en hauteur et 10 cm au niveau de la couronne.



Plantules en milieu naturel