

Myriophylle du Brésil

Myriophyllum aquaticum
Haloragaceae



Méthode de lutte préconisée

■ Arrachage manuel :

A partir de la berge ou à partir de barques.

Arrachage manuel en remontant la plante.

Utilisation de crocs pour les grands herbiers.

+

■ Arrachage mécanique :

Pelle mécanique avec godet griffe pour arracher les individus et racines.

Utilisation d'un filet en aval pour récupérer les fragments de plantes.

■ Recommandations :

Attention lors de l'arrachage aussi bien manuel que mécanique, des portions de plante se retrouveront dans le courant. Il est impératif de limiter leur dispersion. La plante repart facilement.

Stockage hors sol, hors contact de l'eau et de la terre.

Suivit régulier sur le cours d'eau et en zone de stockage **sur plusieurs années.**

Attention aux autres espèces présentes.

Autres méthodes de lutte testées

■ Arrachage manuel simplement.

→ Inefficace, l'espèce repart rapidement de manière végétative (racines + portion de plante).

■ Arrachage mécanique simple.

→ Inefficace, l'espèce repart. Technique moins précise.

■ Lutte biologique.

→ Utilisation du pathogène *Pythium carolinianum*.

→ Réduit la croissance de l'espèce.

→ Attention : interfère avec les flux d'eau et les nutriments présents.

→ Possibilité d'attaque sur d'autres espèces.



La réglementation interdit d'utiliser des phytocides