

Aeschynomene brevifolia | FABACEAE

Nom commun principal : -

Synonyme : *Aeschynomene micrantha* (Poir.) DC.



DESCRIPTION

Herbe pérenne*, à tiges longues de 10-60 cm croissant ± horizontalement et légèrement redressées à l'extrémité.


Feuilles à pétiole* court, compo-

sées* de 5-11 folioles* de 2,5-11 x 1,5-6,5 mm elliptiques* à obovales* à base arrondie à tronquée et au sommet portant un mucron*, à nervation proéminente sur la face inférieure, portant des stipules ovales-acuminées longues de 2-5 mm. Fleurs 2-8, portées

par un rachis* grêle long de 0,5-8 cm duquel partent des axes secondaires de 3-6 mm, marquées par un pétale* supérieur développé de couleur jaune à orangé strié de rouge

et long de 5-7 mm.

Fruits long de 1,5-2,5 cm, à 1-5 articles* de 3-4 x 3-4 mm profondément étranglés, de couleur brun clair à maturité. Monoïque*.






Écologie

Plante présente de la zone littorale jusqu'à 650 m d'altitude (de La Possession à Saint-Benoît), au sein de milieux ouverts (pelouses, bord de route).


Confusions possibles

Les autres espèces d'*Aeschynomene* présentes à La Réunion (*A. americana*, *A. indica*, *A. patula*, *A. uniflora*) se distinguent d'*A. brevifolia* par un nombre plus important de folioles* (6-40 paires) et par leur forme plus linéaire-oblongue*.



Remarques

Espèce indigène présente à La Réunion et Maurice au sein des Mascareignes, mais aussi à Madagascar et au Mozambique.



Crédit photographique

Joël DUPONT
Christian FONTAINE