

Bulbostylis barbata | CYPERACEAE



Nom commun principal : -

Synonyme : *Scirpus barbatus* Rottb.

DESCRIPTION

Petit herbe annuelle, grêle, cespitose (poussant en touffe), de 5 à 20 cm et jusqu'à 35 cm de hauteur.

Feuilles à limbe filiforme de 4-10

x 0,1-0,4 cm, à marges scabres* surtout vers le sommet, poilues à l'insertion de la gaine et du limbe. Pédoncule grêle strié, portant une inflorescence terminale capitée de 10-15 mm de diamètre, à plusieurs bractées* filiformes, longues de 5-20 mm, à nom-

breux épillets (3-15 (-20) courts et sessiles.

Glumes* de 2 mm, fortement carénées, courtement mucronées*, possédant une nervure forte de chaque côté de la carène, pubérulentes à subgla-

bres mais ciliolées. Étamine 1. Style très court.

Fruits de type akène* obovoïde-trigone, de couleur crème, lisse, ou finement fovéolé*-réticulé*, longs de 0,5-0,75 mm.






Écologie

Petite herbe inféodée aux zones de savane.

Confusions possibles

Confusion possible avec *Bulbostylis puberula* qui possède des feuilles et des pédoncules pubescents, une inflorescence en forme d'ombelle (anthèle) et des akènes de couleur blanchâtre.



Remarques

Espèce des régions tropicales et subtropicales du Vieux Monde et présente à La Réunion et à Maurice au sein des Mascareignes.



Crédit photographique :

Christian FONTAINE
Herbier CBNM