

Carissa spinarum | APOCYNACEAE

Nom commun principal : Bois amer

Synonyme : *Carissa xylopicron* Thouars



DESCRIPTION

Arbuste à ramifications dichotomiques, pouvant atteindre 4 m de haut, à latex* blanc, à épines jumelées d'environ 1 cm de long présentes sur les fourches des rameaux des plantes juvéniles ou

sur les drageons. Feuilles opposées*, coriaces, de forme elliptique*, à pétiole* court souvent rougeâtre, à limbe* souvent teinté de rouge, mucroné* au sommet, arrondi à la base, à marges* entières, à face inférieure plus pâle et à nervure médiane bien visible,

de taille très variable entre les plantes juvéniles et les adultes (hétérophyllie*) de 3-30 x 3-20 mm. Fleurs blanches, odorantes, évoquant une étoile, de 2,5-4,5 x 1,2-1,5 mm, groupées en inflorescences solitaires ou par paires portées par un pé-

doncule* long de 10-20 mm sur l'axe des rameaux ou en position terminale. Fruits charnus indéhiscent*s, solitaires ou par paires, ressemblant à des piments de 3 x 1,5 cm, de couleur verte et riche en latex*.






Écologie

Plante inféodée à la série de végétation semi-xérophile de basse et moyenne altitude.

Confusions possibles

Au stade juvénile, les feuilles peuvent être confondues avec celles de *Scolopia heterophylla* (Bois de prune - Salicaceae) dans ses formes juvéniles bien que ce dernier présente des feuilles alternes, dentées au sommet et sur les marges* et qu'il ne contient pas de latex*.

Confusions possibles, toujours à l'état juvénile, avec *Pleurostyliya pachyphloea* où les feuilles juvéniles sont très petites, opposées et à pétioles rougeâtres.



Remarques

Plante recherchée pour ses vertus médicinales.



Crédit photographique

Vincent BOULLET

Christian FONTAINE

Jean HIVERT

Sonia FRANÇOISE

