

Chamaesyce goliana | EUPHORBIACEAE

Nom commun principal : -

Synonyme : *Euphorbia goliana* Lam.


DESCRIPTION

Sous-arbrisseau prostré, à latex* blanc, pouvant atteindre 20 cm de hauteur, à fort pivot racinaire. Feuilles opposées*, à pétiole* court, à limbe* asymétrique de 2-

3 x 1,5-2 mm, quasi circulaire, à base échancrée en forme de cœur, à marges* entières à denticulées, pouvant présenter une couleur variable du brun-rouge, vert bordé de rou-

ge au vert franc. Fleurs mâles et femelles regroupées et entourées d'une enveloppe caliciforme (cyathium) positionné de manière solitaire sur la

partie terminale des rameaux. Fruits à 3 arrêtes, de 2 mm de diamètre. Monoïque*.






Écologie

Plante pionnière des substrats basaltiques littoraux, connue uniquement au sud de La Réunion au sein de deux systèmes de végétation côtière : le système littoral des trottoirs alluvionnaires et le système littoral des falaises basaltiques « au vent ».


Confusions possibles

Peut être confondue avec *C. reconciliationis* et *C. viridula*, mais s'en distingue par des feuilles beaucoup plus petites ne dépassant pas 3 × 2 mm et des cyathiums solitaires et terminaux. Confusion également possible avec *C. serpens* dont les feuilles sont semblables et les cyathiums solitaires et axillaire*s mais dont les tiges s'enracinent aux nœuds, contrairement à *C. golianna*.



Remarques

Récoltée pour la première fois par P. COMMERSON en 1771 à l'embouchure de l'étang du Gol. Non revue depuis plus d'un quart de siècle, la plante a été retrouvée récemment sur le littoral du sud-ouest de l'île (V. BOULLET, 18 juin 2004).



Crédit photographique

Christian FONTAINE
Sonia FRANÇOISE