

Claoxylon setosum | EUPHORBIACEAE

Nom commun principal : -

Synonyme : *Claoxylon grandifolium* auct. non (Poir.) Müll.Arg.

DESCRIPTION

Arbuste à jeunes ramilles* couvertes de poils denses et dressés longs de 1 mm et de couleur jaune brun.

Feuilles groupées au sommet des ramilles*, insérées ± en hélice, à pétiole* long de 0,5-4 cm couvert

de poils denses, à limbe* de forme ± ovale, de 6-12 x 2-8 cm, à sommet généralement arrondi, à base rétrécie en angle aigu, plus pâle, brillant et glauque sur la face inférieure, souvent couvert de poils soyeux persistants, à marges* munies de dents aiguës dirigées vers le sommet, à nervure médiane proémi-

nente dessous. Fleurs nombreuses, réparties le long d'un pédoncule* axillaire* formant une inflorescence robuste, dense et couverte de poils identiques à ceux des ramilles*, mâles et femelles portés par des individus distincts.

Fruits généralement nombreux et rapprochés sur l'axe, formés de 3 loges, de forme ± sphérique et légèrement aplatie, longs de 4-5 mm et déhiscents* de la base vers le sommet. Espèce dioïque*.






Écologie

Plante répartie historiquement selon une aire relativement restreinte allant de la Roche Écrite au Morne de Fourche au sein des forêts humides vers 1500-1700 m d'altitude.

Confusions possibles

Confusion possible avec d'autres espèces de *Claoxylon*. *C. setosum* peut notamment être confondu avec *C. glandulosum* (dents du limbe* moins aiguës, pilosité moins importante et inflorescence moins robuste et moins dense que *C. setosum*) ou avec *C. dolichostachyum* (poils inférieurs à 1 mm de long, face inférieure des feuilles non glauque et non brillante). Les feuilles sèches de *C. setosum* gardent la même couleur jaune brun que sur le frais tandis que celles de *C. glandulosum* prennent une teinte bleuâtre et celles de *C. dolichostachyum* brunâtre.



Remarques

Espèce endémique de La Réunion.

