

Eulophia borbonica | ORCHIDACEAE

Nom commun principal : -

Synonyme : -

DESCRIPTION

Orchidée terrestre à pseudobulbes cylindro-coniques à 3 articles chacun (3-6 × 0,7-0,8 cm), vert sombre, portant de 1 à 10 feuilles, rarement unifoliés. Les pseudobulbes reliés ou juxtaposés par un court rhizome linéaire.

Feuilles pétiolées, coriaces, à marges entières ou un peu ondulées ; limbe ovale à oblong, 2,5-5 × 1,5-2,5 cm, vert marbré plus sombre dessus, vert plus clair dessous, plurinervé, à 3 nervures principales plus claires ; pétiole long de 10-25 mm, canaliculé. Inflorescence naissant à la base du dernier pseudobulbe, longue de 10-12 cm, dépassant les feuilles. Racè-

mes pauciflores (5-6 fleurs), longs de 2-4 cm, à axe glabre. Fleurs blanches s'ouvrant peu, à sépales 3-nervés, oblongs, 6-6,5 × 2 mm ; à pétales de même longueur que les sépales mais un peu plus larges (2,5 mm), 3-nervés ; à labelle de contour ovale, 6-7 × 6-6,5 mm (étalé), 3-lobé, 5-nervé ; à lobes latéraux arrondis, dressés, atteignant les

2/3 de la longueur du labelle, portant quelques poils papilleux courts ; éperon jaune citron puis brunâtre, dans le prolongement du labelle, droit, long de 3-4 mm, terminé par un renflement sphérique de 1-1,5 mm de diamètre.

Capsule côtelée de 3-4 cm de longueur.






Écologie

Espèce présente au sein des forêts mégathermes semi-xérophiles.
Floraison en mars.

Confusions possibles

Aucune.



Remarques

Les feuilles très coriaces, marbrées de vert sombre, rappellent plus celles de certains *Oeceoclades*. La fleur est typiquement celle d'un *Eulophia* (BOSSER & MORAT 2001). *Eulophia borbonica* est caractérisée par ses pseudobulbes et sa fleur et ne se rapproche d'aucune espèce connue des Mascareignes ou de Madagascar (BOSSER J. 2002).



Crédit photographique

Sonia FRANÇOISE