

Gleichenia boryi var. boryi | GLEICHENIACEAE

Nom commun principal : -

Synonyme : -

DESCRIPTION

Fougère à rhizome longuement rampant, brun, cylindrique, de ± 1 mm de diamètre, glabre excepté quelques rares poils bruns foncés à la base du pétiole.

Frondes pouvant dépasser 50 cm de long. Feuilles espacées, atteignant 30 cm de longueur, souvent glaucescentes sur la face inférieure ; pétiole glabre, brun, long de 10-15 cm ; limbe ovale, de $\pm 10 \times 10$ cm, bipenné, imparipenné*,

pubescent sur la face inférieure (axes compris).

Pennes 7-9 paires, subopposées*, pétiolulées, à pinnules* de $\pm 2 \times 0,2$ cm, subopposées* à alternes*, sessiles*, à seg-

ments ultimes triangulaires et un peu falqués*.

Sores* solitaires sur les segments ultimes, à 3-4 sporanges.






Écologie

Souvent dans la strate inférieure des formations éricoïdes pionnières, parmi les sphaignes, en forêt ou sur crêtes à *Erica reunionensis*.

Confusions possibles

Confusion possible avec *Gleichenia polypodioides*, mais cette dernière est d'aspect dichotome.

Aussi, *G. boryi* var. *boryi* se distingue de *G. boryi* var. *madagascariensis* par la présence d'un revêtement écailleux brun roussâtre surtout sur la face inférieure des pinnules alors que le limbe est glabre pour la variété *madagascariensis*.



Remarques

Endémique de La Réunion, *Gleichenia boryi* var. *boryi* ne bénéficie pas d'une protection réglementaire. Il en est de même pour la variété *madagascariensis*, endémique de La Réunion et de Madagascar.



Crédit photographique :

Johnny FÉRARD

Jean HIVERT

Herbarium Musei Parisiensis - MNHN