

# Hypodematium crenatum | HYPODEMATIACEAE

Nom commun principal : -

Synonyme : *Polypodium crenatum* Forssk.



## DESCRIPTION

Fougère à rhizome court, rampant, atteignant 3 cm de diamètre, couvert d'écaillles entières, denses, ferrugineuses, lancéolées\*, longuement rétrécies au sommet.

Feuilles très rapprochées, atteignant 45 cm de longueur ; pétiole vert à straminé\*, renflé et écaillé à la base, glabre\* au-dessus.

Limbe ové-triangulaire, 4-pinnatifide\*, le plus souvent à peine plus long que large, de 12-28 x 12-25 cm, couvert sur les 2 faces de longs poils uni-

cellulaires\* ; pennes alternes, pétiolées, oblongues\*-subtriangulaires, les supérieures de plus en plus petites ; segments ultimes oblongs-subtriangulaires, lobés, adnés\* à la base, obtus\*-subtronqués\* au sommet ; lobes obliques, oblongs\*, cré-

nelés ; nervures libres, pennées, atteignant la marge.

Sores subarrondis à réniformes, dorsaux sur les nervures ; indusie réniforme couverte de poils denses, droits, blancs et unicellulaires.








### Écologie

Présente dans les forêts mégathèmes hygrophyles de la côte sous le vent et du cirque de Mafate.

### Confusions possibles

Aucune.



### Remarques

Bien que cette espèce soit exceptionnelle à La Réunion, elle existe aussi aux îles du Cap-Vert, de la Zambie jusqu'en Éthiopie, au Yémen, dans la région malgache, du sud de l'Asie jusqu'au Japon, en Malaisie, à Sumatra et dans des îles du Pacifique.



Crédit photographique

Christian FONTAINE  
Jean Maurice TAMON

