

Vittaria zosterifolia | PTERIDACEAE

Nom commun principal : -

Synonyme : *Vittaria angustifrons* auct. non Michx.

DESCRIPTION

Fougère à rhizome longuement rampant, couvert d'écaillés brun noir, lancéolées, longuement subulées*, atteignant 10 mm de


longueur, à marges dentées.

Feuilles espacées, pendantes, parfois flexueuses, atteignant plus d'1 m de longueur, larges de 3-13 mm, graduellement

rétrécies vers la base ; base étroite et ± longue.

Nervure médiane distincte, les latérales ± distinctes sur les feuilles les plus larges ; à marges ± réfléchies.

Sores marginaux ; paraphyses* turbinées.



- 1 : Aspect général
- 2 : Fragment de limbe
- 3 : Écaille
- 4 : Paraphyse
- 5 : Spore




Écologie

Fougère épiphyte, sciaphile, en forêts de l'étage humide de basse et moyenne altitude.

Confusions possibles

On pourrait la confondre avec *Vittaria ensiformis*, mais cette dernière possède des feuilles plus courtes (35-40 cm) et moins larges (0,4-0,7 cm).



Remarques

Bien que l'espèce soit présente aux Philippines, en Polynésie, en Malaisie et à Maurice, elle reste exceptionnelle à La Réunion.



Crédit photographique :

Christian FONTAINE

D. GODOT DE MAUROY, Flore de Madagascar et des Comores in *plantillustrations.org*, Missouri Botanical Garden