


# Choca vert - *Furcraea foetida* (L.) Haw.

Famille des Asparagaceae (ex Agavaceae)

Espèce exotique très envahissante [A TRAITER]



Allure générale

Épines marginales

Épine terminale

Plantule

Mât

Fleurs

Bulbille

**Distribution générale** : espèce originaire d'Amérique centrale (Guyane, Suriname) et des Caraïbes, cultivée dans de nombreuses régions sèches dans le monde et naturalisée entre autres en Amérique du Sud (Brésil, Bolivie, Venezuela, Costa Rica), en Amérique du Nord (Floride), dans le Pacifique (Hawaii, Polynésie Française, Fidji, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Tonga, Vanuatu), en Australie, en Asie (Pakistan, Inde, Sri Lanka), en Afrique (Gabon, Les Comores, Madagascar) et dans les 3 îles des Mascareignes.

**Situation Réunion** : espèce très fréquente ; très envahissante à basse altitude sur tout le pourtour de l'île ainsi que dans l'ensemble des régions sèches à basse et moyenne altitude (régions nord, ouest et sud, cirques de Mafate et de Cilaos).

**Description** : plante en forme de rosette\* de grande taille ; feuille ± souple, de couleur vert clair à jaune, pouvant atteindre 250 cm de long et 20 cm de large, portant sur le bord - uniquement à sa base - des épines à l'extrémité ± courbée (caractère parfois absent), terminée par une épine fine et rigide longue de 3 cm et de couleur brun clair ; mât\* dressé, à allure légèrement courbée, haut de 4-7 m, de diamètre moyen, portant de façon diffuse sur les rameaux des fleurs pendantes blanches, produisant des bulbilles\*. Possibilité de rejets\*.

**Remarques** : espèce initialement cultivée pour des raisons économiques (emploi de la fibre sous le nom de chanvre de Maurice) et alimentaires (consommation du chou) constituant aujourd'hui l'une des principales menaces pour les reliques de forêt indigène semi-sèche.

\* GLOSSAIRE : Rosette = disposition des feuilles rassemblées à la base d'une tige. Mât = tige dressée partant de la base et portant les organes reproducteurs. Bulbille = petit bulbe aérien muni de feuilles servant à la reproduction végétative. Rejet : jeune pousse naissant de la souche ou d'une racine du pied mère.