

Casearia coriacea Vent.

Famille: Salicaceae

Nom vernaculaire : Bois de cabri rouge

Statut endémique



Limite altitudinale




Feuilles adultes

Simple, alternes, entières, pétiolées. Limbe à forme variable, ovale, obovale, elliptique, souvent obtus ou arrondi au sommet, glabre. La nervure principale est généralement jaune clair mais jamais rouge.



Germination





Identification



Les **1ères feuilles** sont simples, insérées en hélice. La nervure principale est rouge vif et débordant rarement sur les nervures secondaires. La marge présente des dents très fines (1).

Les **feuilles juvéniles** sont simples, alternes, la nervure principale est rouge, avec une coloration qui peut être plus atténuée; la marge est entière et n'est plus dentée. Le sommet du limbe est aigu à la pointe arrondie (3). Les rameaux feuillés présentent une architecture caractéristique en « zig-zag »(4).

Outre la nervure principale rouge (2), certaines feuilles présentent une asymétrie très prononcée. Certaines feuilles peuvent être déformées avec une partie du limbe tronquée (4).



Problèmes d'identification

L'espèce peut être confondue avec *Antidesma madagascariensis* qui possède des domaties. *Casearia coriacea* diffère d'*Apodytes dimidiata* qui présente une nervure violacée et des feuilles oblongues et plus allongées. Au stade plantule, *Casearia coriacea* peut être confondu avec *Homalium paniculatum*.