

Mimusops balata (Aubl.) C.F. Gaertn.

Famille: Sapotaceae

Nom vernaculaire: Grand natte

Statut endémique



Limite
altitudinale



Feuilles adultes

Simple, alternes, groupées à l'extrémité des rameaux, entières. Limbe elliptique et nervures secondaires parallèles entre elles.



Germination



Identification



Les **cotylédons** sont de très grande taille (5 à 7 cm), vert foncé, très arrondis, la nervure principale est jaune, la marge est marquée par un liseré jaune (1 et 2).

Les **1ères feuilles** sont elliptiques, alternes, la nervure principale déprimée est jaune (3 et 4).



Les cotylédons et les premières feuilles ont un **liseré** jaune remarquable sur toute la marge (2 et 3).

Problèmes d'identification

La couleur des premières feuilles est variable (du vert foncé au vert pâle). Par ailleurs, l'espèce peut être facilement confondue avec *Labourdonnaisia calophylloides* (Petit Natte). Néanmoins les cotylédons du Petit natte sont beaucoup plus ovales, ils sont vert clair, et ne possèdent pas un liseré jaune sur la marge. Au niveau des feuilles juvéniles, le Petit natte peut présenter des marges parallèles alors que le limbe des feuilles du Grand natte sont toujours elliptiques.