



CHEVALIER GUIGNETTE

Actitis hypoleucos




PROTÉGÉ

CR EN VU NT LC

Indigène - Non nicheur - Taille : 19 cm - Poids : 50 g


Oiseau migrateur, il est visible à La Réunion pendant tout l'été austral. C'est l'un des limicoles les plus fréquemment observés à La Réunion. Il fréquente les zones humides : étangs et embouchures de rivières. Contrairement à d'autres limicoles, il semble préférer les galets aux zones sableuses. Il niche en Europe de l'Est, l'Ouest de la Sibérie, en Turquie et en Iran.

EVOLUTION DU NOMBRE D'OBSERVATIONS




Le nombre de signalement oscille entre 30 et 80 par an, ce qui en fait le migrateur le plus commun à La Réunion. Des variations annuelles sont assez marquées (du simple au double), mais il est difficile de savoir si cela reflète la fréquentation des oiseaux, ou la pression d'observation sur les sites-clé.

PERIODE DE PRESENCE




Il s'agit du limicole le plus facilement observable, non seulement en raison de sa relative abondance, mais aussi en raison de sa période de présence très étendue. Le maximum d'observations se concentre en octobre-novembre, mais on peut le voir d'août à mars.

REPARTITION SPATIALE



La répartition spatiale de cette espèce est plus diffuse que pour la plupart des autres limicoles. La côte Ouest, en particulier l'Etang du Gol, cumulent beaucoup d'observations, mais c'est également le cas sur la zone de St Denis, et à l'embouchure des rivières dans l'Est. On note enfin quelques observations dans le lit des grandes rivières d'eau permanente, et ce, assez loin à l'intérieure des terres.



Les données STOC ont été collectées de 2013 à 2016 par la SEOR et le Parc National de La Réunion. Les données de www.faune-reunion.fr sont collectées depuis 2012. Un millier de données d'archive de la SEOR y ont été intégrées.