



# COURLIS CORLIEU

*Numenius phaeopus*



**PROTÉGÉ**



CR EN VU NT LC

Indigène - Non nicheur - Taille : 46 cm - Poids : 450 g

Oiseau migrateur, il est visible à La Réunion pendant l'été austral. Limicole un peu plus imposant que les autres qui fréquentent l'île, il est facilement reconnaissable à son long bec courbé vers le bas. Il fréquente les zones humides : étangs, embouchures de rivières, littoral, et prairies humides. Il niche en Scandinavie dans l'ouest de la Sibérie.

## EVOLUTION DU NOMBRE D'OBSERVATIONS


## PERIODE DE PRESENCE




Quelques dizaines d'individus sont signalés chaque année. Après une baisse du nombre relatif d'observations, cela semble reparti à la hausse.

Si le mois d'octobre concentre le plus grand nombre d'observations, la particularité de cette espèce est d'être potentiellement visible toute l'année. Sur d'autres sites de l'hémisphère Sud, on a déjà observé de jeunes Courlis restant pendant l'hiver (austral), et n'effectuant pas la migration de retour. C'est donc probablement le cas des individus observés sur l'île d'avril à août.

## REPARTITION SPATIALE



Inféodé au littoral il semble cependant moins exigeant que d'autres limicoles sur la nature et l'exposition de la côte. On peut en effet l'observer presque tout le tour de l'île.



Répartition spatiale des observations de Faune-Réunion

Les données STOC ont été collectées de 2013 à 2016 par la SEOR et le Parc National de La Réunion. Les données de www.faune-reunion.fr sont collectées depuis 2012. Un millier de données d'archive de la SEOR y ont été intégrées.