



CHEVALIER ABOYEUR

Tringa nebularia




PROTÉGÉ

CR EN VU NT LC


Indigène - Non nicheur - Taille : 30 cm - Poids : 200 g

Oiseau migrateur, il est visible à La Réunion pendant l'été austral, en plumage internuptial. Il fréquente alors les zones humides : étangs et embouchures de rivières. Il niche en Scandinavie et dans l'Ouest de la Sibérie.

EVOLUTION DU NOMBRE D'OBSERVATIONS




PERIODE DE PRESENCE




Même si le nombre annuel d'individus signalés est assez faible (de 2 à 20), c'est une des rares espèces de limicole dont le nombre relatif d'observations semble plutôt en hausse à La Réunion.

La période de présence de cette espèce est relativement étendue : observable dès le mois d'août et jusqu'en février.

REPARTITION SPATIALE



Les sites où cette espèce a été observée à La Réunion ne diffèrent guère des autres limicoles : Etang du Gol, Littoral Ouest, et embouchure de la Rivière du Mât.



Répartition spatiale des observations de Faune-Réunion

Les données STOC ont été collectées de 2013 à 2016 par la SEOR et le Parc National de La Réunion. Les données de www.faune-reunion.fr sont collectées depuis 2012. Un millier de données d'archive de la SEOR y ont été intégrées.